

## Bamberger Demenz-Screening Test (BDST)

Geriatrische Patienten sind oft nicht in der Lage, Aufgaben in den klassischen kognitiven Screeningverfahren zu bearbeiten, weil sie z.B. aufgrund ihrer körperlichen oder sensorischen Einschränkungen schlecht zeichnen oder schreiben können. Beim Bamberger Demenz Screening Test (BDST) handelt es sich um ein Screeningverfahren, das gezielt im Hinblick auf diese Problematik entwickelt wurde. Der BDST ist in wenigen Minuten als Bedside-Test durchführbar. Auch ohne ein Testformular, das dem Probanden vorgelegt wird, enthält der BDST Aufgaben zur verbalen Flüssigkeit, zur kognitiven Flexibilität und zur konstruktiven Praxis und liefert unter anderem Informationen über die semantische, verbale und visuell-räumliche episodische Gedächtnisleistung.

**Literatur:** Trapp W., Weisenberger B., Düclos D., Lautenbacher S., Mitznegg M., Meyrer R., Hajak, G. The Bamberger Dementia Screening Test (BDST) – first evidence regarding the diagnostic usability of a “true bedside” test for geriatric inpatients. *Zeitschrift für Neuropsychologie*, 2015; 26(3): 161-170